

Deoxyguanosine Factors and Protein Carbonyl Groups as Markers of Oxidative Stress in the Fasting Individuals in Tehran

Abdolhossein Bastani¹, Fatemeh Azadmanesh^{1*}, Mohammad Hassan Heidari², Reza Haji Hosseini Baghdadabadi³

1. ClinicalBiochemistry department, Medical Sciences School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2-Biology and Anatomy Department, Medical Sciences School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3- ClinicalBiochemistry department, National Laboratory, Payame Noor University, Tehran, Iran.

Abstract:

Background and Objectives: Oxidative stress represents an imbalance between the production of reactive oxygen species and a biological system's ability to readily detoxify the reactive intermediates or to repair the resulting damage. Calorie restriction can reduce the damages caused by oxidative stress.

Methods: The subjects, who were healthy males and females able to fast for a month, were randomly selected from the staff of Hippocrates and Imam Khomeini hospitals. Samples of their serum and urine were collected three times, i.e. 4 days before fasting as control, on the 14th day of fasting, and on the 29th day of fasting. Plasma malondialdehyde levels were measured using HPLC technique, while the levels of protein carbonyl groups in plasma, and the levels of 8-iso prostaglandin F2 α and 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine were measured by ELISA technique. The data were analyzed using SPSS, t test paired samples, Independent t test the level of statistical significance was considered to be $p < 0.05$.

Results: Totally, 60 subjects participated in the study, where seven participants were male (11%) and 53 subjects (89%) were female. Mean and SD of the age of the participants were 37 ± 10 years. Concentrations of plasma malondialdehyde and 8-iso prostaglandin F2 α in urine showed a significant decrease during fasting in Ramadan in all subjects compared with the control samples; moreover, their levels in the third sampling round were significantly lower than that in the second one ($p < 0.01$).

Conclusion: Since plasma levels of MDA and urine levels of 8-isoPGF significantly were decreased during fasting in Ramadan. It seems that fasting a month decreased oxidative stress. we hope that with more study in future ,we can use Ramadan fasting as a natural way to protect human against different disease which oxidative stress is involved.

Keywords: Fasting, Malondialdehyde, 8-iso prostaglandin F2 α , 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine, Protein carbonyl.

* Corresponding Author: Fatemeh Azadmanesh; Email:z62z62@yahoo.com

ارزیابی فاکتورهای مالون دی‌آلدئید، آیزو پروستاگلاندین F2α، هیدروکسی داکسی گوانوزین و گروههای پروتئین کربونیل به عنوان شاخص‌های استرس اکسیداتیو در افراد روزه‌دار در شهر تهران

عبدالحسین باستانی^۱، فاطمه آزادمنش^{*}، محمد حسن حیدری^۲، دکتر رضا حاجی حسینی بغدادآبادی^۳

۱- گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۲- گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۳- گروه بیوشیمی بالینی، آزمایشگاه ملی و قطبی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سابقه و اهداف: استرس اکسیداتیو یک عدم تعادل بین تولید ROS و توانایی سیستم‌های بیولوژیکی برای سمزدایی سریع با واکنش‌های واسطه یا تعمیر آسیب‌های وارد شده است. روزه‌داری حدس زده می‌شود که اثرهای مفیدی روی کاهش استرس اکسیداتیو داشته باشد.

مواد و روش‌ها: از ۰ عنفر (هفت مرد (۱۱٪) و ۵۳ زن (۸۹٪)؛ میانگین سن ۳۷ ± ۱۰ سال)؛ سه بار نمونه‌ی خون و ادرار گرفته شد. نوبت اول چهار روز قبل از روزه‌داری برای کنترل؛ نوبت دوم (روز چهاردهم ماه روزه‌داری) و نوبت سوم (روز بیست و نهم ماه روزه‌داری) در ماه روزه‌داری نمونه گرفته شد.

این مطالعه تغییرهای سطح پلاسمایی مالون دی‌آلدئید با تکنیک HPLC و سطح پلاسمایی گروههای پروتئین کربونیل، سطح ادراری آیزو پروستاگلاندین F2α و هیدروکسی داکسی گوانوزین را با تکنیک الایزا مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از سنجش این متغیرها با استفاده از نرم افزار Independent t test و SPSS t test paired samples مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: مطابق این پژوهش، غلظت مالون دی‌آلدئید پلاسما و آیزو پروستاگلاندین F2α ادرار در طول روزه‌داری در ماه رمضان در کل افراد مورد آزمایش نسبت به کنترل و همچنین میزان این پارامترها در نوبت سوم نسبت به دوم کاهش معنا داری نشان (p<0.01) دادند.

نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش قابل ملاحظه‌ی غلظت مالون دی‌آلدئید پلاسما و آیزو پروستاگلاندین F2α ادرار در طول روزه‌داری در ماه رمضان می‌توان عنوان کرد که روزه داری یک ماه استرس اکسیداتیو را کاهش می‌دهد. می‌توان با تکیه بر مطالعات بیشتر، از روزه‌داری برای جلوگیری از بروز و پیشرفت بیماری‌هایی که استرس اکسیداتیو در آن‌ها دخیل است، بهره گرفت.

وازگان کلیدی: روزه‌داری، مالون دی‌آلدئید، آیزو پروستاگلاندین F2α، هیدروکسی داکسی گوانوزین و پروتئین کربونیل

مقدمه شود؛ اثرهای مضر این رادیکال‌های آزاد در بیماری‌های مختلف

مانند دیابت، آلزایمر، پارکینسون و بیماری‌های قلبی مشاهده می‌شود (۱). یکی از راههای کاهش میزان استرس اکسیداتیو، محدود کردن رژیم غذایی و دریافت کالری است. بنابراین

استرس اکسیداتیو، ناشی از رادیکال‌های آزاد است. این خسارت می‌تواند ارگان‌های مختلف موجود زنده را درگیر کند و سبب پدید آمدن اشکال و نارسایی در ارگان‌های مختلف

این تحقیق تغییرهای سطح MDA و گروههای کربونیل پروتئین در پلاسما و نیز ۸-ایزو پروستاگلاندین F2 α و ۸-هیدروکسی داکسی گوانوزین را در ادرار طی روزه‌داری به عنوان شاخصهای استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار داده است.

مواد و روش‌ها

افراد مورد مطالعه از بین پرسنل آزمایشگاه بقراط و بیمارستان امام خمینی انتخاب شدند. تمام افراد توانایی روزه‌داری را داشتند و همگی داوطلبانه و با رضایت در این مطالعه شرکت کردند.

همه افراد از نظر معاینه‌های بالینی، سالم بودند و از نظر بیماری‌های زمینه‌یی مزمن (دیابت، بیماری تیروئید، بیماری‌های روماتولوژیک، انواع سرطان، بیماری‌های کبدی و کلیوی و اختلال‌های متابولیک و ژنتیک) سالم بودند. تعداد نمونه، ۶۰ نفر بود که ۷ نفر مذکر و ۵۳ نفر مؤنث بودند. افراد مورد مطالعه، همگی در محدوده سنی ۲۵-۵۰ سال بودند. از افراد مورد مطالعه یک نوبت قبل از روزه‌داری و دو نوبت طی ماه مبارک رمضان (روزهای ۱۵ و ۲۸) نمونه‌های خون و ادرار گرفته شد. این دو نوبت با کنترل مورد مقایسه قرار گرفت.

MDA در پلاسما با روش iso PGF 2α -HPLC و ۸-OHdG در ادرار؛ و گروههای پروتئین کربونیل در پلاسما با ELISA مورد بررسی قرار گرفت.

کیت‌های الایزا پروتئین کربونیل، مارک cell biolabs (ساخت کشور کره)، ۸-iso PGF 2α ، مارک cell biolabs (ساخت کشور کره)، ۸-۸-OHdG، مارک cell biolabs (ساخت کشور کره) بودند و مواد مصرفی دیگر از شرکت نوژن طب تهیه شدند.

یافته‌ها

در این مطالعه میزان ۸-هیدروکسی داکسی گوانوزین، پروتئین کربونیل و ۸-ایزو پروستاگلاندین F2 α با استفاده از شیوه‌ی الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت و جذب نمونه‌ها در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه‌گیری شد و سپس غلظت هر نمونه با کمک منحنی استاندارد که به ترتیب در نمودارهای ۱، ۲ و ۳ نشان داده شده، محاسبه شد. میزان مالونیل آلدئید با شیوه‌ی HPLC مورد ارزیابی قرار گرفت و جذب نوری نمونه‌ها در طول موج ۵۳۲ نانومتر اندازه‌گیری شد. سپس غلظت هر نمونه با کمک منحنی استاندارد محاسبه شد (۴). پیک‌های مربوط به استانداردها و نمونه‌ی مجھول، با HPLC به ترتیب در نمودار ۵ و ۶ نشان داده شده است. با استفاده از نرم افزار

مهتم‌ترین هدف در این تحقیق، این است که اثرات روزه‌داری بر روی استرس اکسیداتیو و محصولات لیپیدی، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک بررسی شود. محدودیت کالری در تمام موارد موجب کاهش ایجاد محصولات اکسیداتیو ناشی از تأثیر رادیکال‌ها بر لیپیدها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک می‌شود. محدودیت کالری سبب کاهش اثرهای مرتبط با آسیب‌های اکسیداتیو بر عملکرد مغز و نقص عملکرد نورون‌ها در مدل‌های حیوانی بیماری آلزایمر، پارکینسون و هانتینگتون شده است (۲ و ۳).



رادیکال‌های اکسیژن موجب آسیب به DNA می‌شود که در کارسینوژن داخلی نقش دارد و این دلیلی محکم برای القای آسیب اکسیداتیو DNA در فاز اولیه‌ی ایجاد تومور مستاساز، است (۴). مطالعه‌های Hart.R.W در سال ۱۹۹۹ نشان داده است که اغلب، دریافت بیشتر غذا و افزایش کالری سبب افزایش پیدایش تومورهای خود به خودی است و طول عمر را کوتاه‌تر می‌کند (۵). افزایش استرس اکسیداتیو و محصول‌های فرعی ناشی از آن به DNA آسیب می‌زند. شاخص اندازه‌گیری آسیب به DNA در این تحقیق، ۸-هیدروکسی دی اکسید گوانوزین است که بر روی تومورها و کارسینوژن‌ها بسیار مؤثر است (۶).

Skrhga.J و همکرانش در سال ۲۰۰۵ با مطالعه بر روی افراد دیابتی، که تحت رژیم درمانی بودند، نشان دادند که میزان مالونیل آلدئید (MDA) پلاسما به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد (۷). میزان MDA در نمونه‌های ادراری افرادی که تحت رژیم کم کالری قرار گرفته بودند، بعد از رژیم نسبت به قبل از آن کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد (۸ و ۹). میزان شاخصهای اکسیداتیو DNA مثل ۸-هیدروکسی دی اکسی گوانوزین (8-OH-dGua) هم بعد از رژیم کاهش یافته بود. مطالعه‌های Holee.k بر روی برنامه‌ی ناشتاپی کوتاه مدت نیز نشان داد که میزان MDA و نیز ۸-ایزو پروستاگلاندین F2 α (8-iso PGF 2α) ادراری بعد از ناشتاپی به مقدار قابل توجهی کمتر از ناشتاپی بوده است (۹).

بالا بودن میزان کربونیل پروتئین، که یک بیومارک شاخص در اکسیداسیون پروتئین‌ها است، در بسیاری از بیماری‌ها از جمله آلزایمر، پارکینسون، دیابت ملیتوس، ارتریت روماتوئید، دیستروفی عضلانی و تومورهای کلیه نیز گزارش شده است (۱۰). روزه گرفتن سبب ایجاد تغییرهایی در بدن می‌شود که همه این تغییرها برای پاکسازی بدن از مواد زائد بهبود آسیب‌های ایجاد شده در بدن است و با خاصیت سم‌здایی خود می‌تواند از مرگ سلول‌ها جلوگیری نماید (۱۱).


Excel، نمودار ستونی مربوط به میانگین نتایج به دست آمده از سه نوبت، رسم گردید. مقایسه‌ی میانگین‌های -۸- ایزو پروستاگلاندین $F_2\alpha$ و مالوندی‌آلدنید در هر سه نوبت، به ترتیب در نمودارهای ۷ و ۸ نشان داده شده است. نتایج نشان داد که در هر دو مورد نمونه‌های نوبت دوم و نیز نوبت سوم نسبت به نوبت اول (کنترل)، کاهش معناداری داشته است ($P<0.05$). نوبت سوم نسبت به دوم کاهش معناداری را نشان داد ($P<0.05$).

نتایج حاصل از میانگین غلظت پروتئین کربونیل و -۸- هیدروکسی داکسی گوانوزین در هر سه نوبت نیز به ترتیب در نمودارهای ۹ و ۱۰ نشان داده شده است. نتایج نشان داد که در هر دو مورد نمونه‌های نوبت دوم و نیز نوبت سوم نسبت به نوبت اول (کنترل) و نیز نوبت سوم نسبت به دوم، تغییر معناداری به چشم نمی‌خورد ($P>0.05$).




نمودار ۲ - غلظت استانداردهای پروتئین کربونیل


نمودار ۱ - غلظت استانداردهای -۸- هیدروکسی داکسی گوانوزین




نمودار ۳ - غلظت استانداردهای -۸- ایزو پروستاگلاندین $F_2\alpha$



نمودار ۷- مقایسه‌ی نمودار ستونی میانگین غلظت ۸-ایزو پروستاگلاندین $F_2\alpha$ در نوبت اول (قبل ماه رمضان)، نوبت دوم (۱۴ ماه رمضان) و نوبت سوم (۲۹ ماه رمضان) با روش الیزا





نمودار ۸- غلظت استانداردهای MDA




نمودار ۹- مقایسه‌ی نمودار ستونی میانگین غلظت MDA در نوبت اول (کنترل)، نوبت دوم (۱۴ ماه رمضان) و نوبت سوم (۲۹ ماه رمضان) با روش HPLC

(a) پیک مربوط به غلظت ۲ میکرو مولار MDA نمونه‌ی استاندارد
(b) پیک مربوط به غلظت ۵/۰ میکرو مولار MDA نمونه‌ی استاندارد

نمودار ۱۰- غلظت‌های معلوم استاندارد




نمودار ۱۱- مقایسه نمودار ستونی مربوط به میانگین غلظت پروتئین کربونیل در نوبت اول (قبل ماه رمضان)، نوبت دوم (۱۴ ماه رمضان) و نوبت سوم (۲۹ ماه رمضان) با روش الیزا



نمودار ۱۲- پیک مربوط به غلظت MDA در نمونه‌ی یکی از افراد روزه‌دار

لیپیدها است. درباره‌ی سبب کاهش MDA، به دو موضوع می‌توان اشاره کرد؛ محدودیت در رژیم غذایی و کاهش نوبت‌های غذا خوردن، موجب پایین آمدن میزان متابولیسم پایه و به دنبال آن، کاهش MDA شده است. در اینجا ممکن است مطلبی در تفاوت محدودیت کالری با روزه‌داری ماه رمضان عنوان شود که احتمال دارد میزان کالری افراد روزه‌دار نسبت به قبل از روزه‌داری تغییری نکرده باشد، اما مطالعه‌هایی که در زمینه‌ی CR، تحت عنوان Intermittent Fasting صورت گرفته، یعنی در افراد تحت مطالعه که یک روز در میان غذا دریافت کرده‌اند و یا تعداد وعده‌های غذایی را در روز کاهش داده اند بی آن که هیچ کاهشی در میزان کالری دریافتی داشته باشند، باز هم اثرهای مفید CR، یعنی کاهش شاخص‌های اکسیداتیو به دست آمده است (۱۴). در مطالعه‌های قبلی که روی حیوانات انجام شد، کاهشی مشخص در آسیب اکسیداتیو به DNA، بعد از ناشتاپی کوتاه مدت، دیده شد (۱۵) در حالی که در این مطالعه تغییری در -۸- هیدروکسی داکسی گوانوزین دیده نشد، که ممکن است تفاوت بین انسان و حیوان را نشان دهد و یا فاکتورهای دیگر مثل تفاوت توانایی بهبود DNA بین انسان و حیوان است که باید در نظر گرفته شود. در سال ۲۰۰۳ مطالعه‌های Turko – umitmutlu و همکارانش نشان دادند که غلظت پروتئین کربونیل در افراد پیر بیشتر از افراد جوان بود، که ناشی از افزایش استرس اکسیداتیو پروتئین‌ها و لیپیدها است (۱۶).

Meydni دریافت کالری را به مدت ۶ ماه، بر روی کاهش استرس اکسیداتیو مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که غلظت -۸- iso PG F2 α ادرار و پروتئین کربونیل پلاسما کاهش داشت، اما غلظت -۸- هیدروکسی اکسی گوانوزین ادرار تغییری نیافت (۱۷). نتایج این تحقیق در مورد غلظت iso PG F2 α و غلظت dGua OH -۸- ادرار با یافته‌های ما مطابقت داشتاما در مورد غلظت پروتئین کربونیل پلاسما متفاوت است که به سبب مدت محدودیت دریافت کالری باشد. در این مقاله مدت محدودیت دریافت کالری شش ماه بود و زمانی که محدودیت کالری به صورت طولانی مدت باشد روى پروتئين و اسيدها نوكليك تأثير دارد و اکسیداسيون آنها را کاهش مى‌دهد، اما در تحقیق حاضر چون در روزه‌داری محدودیت دریافت کالری به صورت کوتاه مدت است، اثری بر روی پروتئین کربونیل نداشت. Lambert. A.J (۱۸) و همکارانش در مقاله‌ی خود عنوان داشته‌اند که CR از طریق کاهش اکسیداسیون سوبسترها موجب کم شدن سرعت زنجیره‌ی تنفسی شده و



نمودار ۱۰- مقایسه‌ی نمودار ستونی میانگین غلظت -۸- هیدروکسی داکسی گوانوزین در نوبت اول (قبل ماه رمضان)، نوبت دوم (۱۴ ماه رمضان) و نوبت سوم (۲۹ ماه رمضان) با روش الایز

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به اثرهای گستردۀ افزایش استرس اکسیداتیو در بیماری‌های متفاوت و همچنین اثرهای آن بر پیری، راههای کاهش استرس اکسیداتیو مورد توجه و تحقیق دانشمندان بوده است. یکی از راههای کاهش میزان استرس اکسیداتیو و گونه‌های فعال اکسیژن و نیتروژن، محدود کردن رژیم غذایی و دریافت کالری (CR) است. مطالعه‌های hoo.k در سال ۲۰۰۶ نشان داد که سطح مالوندی آلدید و -۸- ایزو پروستاگلاندین F2 α ادراری بعد از ناشتاپی کاهش می‌یابد، اما این محدودیت کالری بر بیومارکرهای آسیب اکسیداتیو DNA اثری نداشت (۹) و نتایج این مطالعه با یافته‌های این تحقیق مطابقت داشت. مطالعات Ugocvhwu.N.H نشان داد که محدودیت کالری سبب کاهش MDA پلاسما در موش‌های دیابتی نمی‌شود که نتایج این مطالعه با تحقیق حاضر متفاوت است که و این، به سبب تفاوت انسان با حیوان است (۱۲). مطالعه‌های J. hompson, H. زن بعد از ۱۴ روز مصرف میوه و سبزیجات نشان داد که هیچ تغییری بر روی میزان MDA دیده نشد که با نتایج تحقیق حاضر، متفاوت است؛ علت آن، اندازه گیری MDA ادرار است که غیر اختصاصی و غیر حساس است و به همین سبب است که در این تحقیق MDA پلاسما اندازه گیری شد (۱۳). مطالعه‌های تامسون نیز ۳۵ درصد کاهش در -۸- ایزو پروستاگلاندین F2 α ادرار را نشان داد که با یافته‌های حاضر مطابقت داشت. در تحقیق حاضر میزان MDA پلاسما و -۸- iso PGF2 α ادرار طی روزه‌داری نسبت به قبل از آن، کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد و در طول ماه مبارک رمضان هم هر دوره نسبت به قبل کاهش معناداری یافته است که ناشی از کاهش استرس اکسیداتیو به سبب کاهش پراکسیداسیون

- 8-jiang T, Scott E. Caloric restriction modulation expression of sterol regulatory element binding proteins,lipid accumulation and age related renaldisease. AM J Soc Nephro 2005 ;116.
- 9- Holee K, Bartsch H. Effect of short term fasting on urinary excretion of primary lipid peroxidant in products and markers of oxidative DNA damage in healthy women. Institute for Enviromental Medicin.SNUMRC Seoul 2006;1-17.
- 10- Renke J, Popadiuk S, Korzon M, Bugajczyk B ,Woźniak M . Protein carbonyl groups content as a useful clinical marker of antioxidant barrier impairment in plasma of children with juvenile chronic arthritis. Free Radic Biol Med 2000; 292:101–104.
- 11.Tavernarakis N, Driscoll M. Caloric restriction and lifespan: a role for protein turnover Mech Ageing Dev 2002;123(2-3):215-29.
- 12- Ugochukwu NH, Bagayoko ND, Antwi ME. The effects of dietary caloric restriction on antioxidant statue and lipid peroxidation in mild and severe streptozotocin-induced diabetic rats. Clin Chim Acta2004; 348:121–12
- 13- Thompson HJ, Heimendinger J , Haeghe A, Sedlacek SM,Gillette C, O'Neill C,et al. Effect of increased vegetable and fruit consumption on markers of oxidative cellular damage Carcinogenesis 1999; 20: 2261–226
- 14- Anson R M,GuoZ. Intermittent fasting dissociated beneficaleffects of dietary restriction on glucose metabolism and neuronal resistance to injury from caloric intake. PARS 2003;100(10): 6216-6220
- 15- Bevilacqua L, RamseyJI, Hagopian K, Weindruch R, Harper ME. Effect of short- and medium caloric restriction on muscle mitochondrial proton leak and reactive oxygen species production. Am J Physiol. Endocrinol Metab 2004 ; 286: E852-E861
- 16- Ümit Mutlu-Türkoğlu, Ebru İlhan, Serdar Öztezcan, Alev Kuru, Gülcin Aykaç-Toker ,Müjdut Uysal,et al. Age-related increases in plasma malondialdehyde and protein carbonyl levels and lymphocyte DNA damage in elderly subjects. April 2003
- 17- Meydani M , Band M , Epstein S, Das S , Roberts S. The effect of caloric restriction and glycemic load on measures of oxidative stress and antioxidants in humans. AGE 2006; 28(1):53.
- 18- Lambert AJ, Merry BJ. Effect of caloric restriction on mitochondrial reactive oxygen species production and bioenergetics, reversal by insulin." AM J Physiol 2004 ;268: 71-79.
- 19- Bevilacqua L, Jonj R. Effects of short and medium caloric restriction on muscle mitochondria proton leak and ROS production. AM J Physiol Endocrin Metab2004; 268: E852-E861.

در نتیجه نشت پروتئین افت می‌کند که در نهایت مصرف اکسیژن کاهش می‌یابد. همین طور L در Pevilacqus.L مطالعه‌ی خود اعلام کردند که CR موجب کاهش مصرف اکسیژن و نیز کاهش نشت پروتئین می‌گردد و به دنبال آن ROS کم می‌شود (۱۹). نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روزه‌داری موجب کاهش مشخص بیومارکرهای استرس اکسیداتیو مربوط به پراکسیداسیون لیپیدها 8-iso MDA و PG می‌شود اما بیومارکرهای 8-OH dGua و گروه- DNA و پروتئین کربونیل که در آسیب اکسیداتیو به از روزه‌داری در آن‌ها مشاهده نشد. تفسیر و تعمیم نتایج درباره‌ی کند شدن مسیر بیماری‌های نروژنراتیو و یا بیماری‌های قلبی- عروقی، دیابت، نقص عملکرد کلیه و کبد، همچنین اثرهای CR بر افزایش طول عمر، منوط به مطالعه‌های بیشتر و گسترش‌تری است.

محدودیت‌های تحقیق

به علت عدم امکانات وب ودجه برای داشتن رژیم غذایی یکسان، از این فاکتور صرف نظر شد. فقط به افراد توصیه می‌کردیم در زمان افطار و سحر از مصرف چربی‌ها و غذاهای پرکالری خودداری کنند. پیشنهاد داشتن رژیم یکسان از طرف ما به عنوان این که در تحقیقات بعدی لحاظ شود در جلسه‌ی دفاع عنوان شد.

References

- 1-de Diego-Otero Y, Romero-Zerbo Y, Bekay R, Decara J, Sanchez L, Rodriguez-de Fonseca F,et al. Alpha-tocopherol protects against oxidative stress in the fragile X knockout mouse. Neuro Psycho Pharmacology 2009; 34 (4): 1011–26
- 2-B.M, M. MP.Aging .Res Rev2006; 5: 332-353.
- 3.-DuanW ,M. MP. Aging. Neuro J Sci Res1999;57: 195-206
- 4-W RL. Endogenous gene toxic aged rats and procecess as abasis of spontaneous carcinogenesis . Mutant Res1990 ; 238 : 287-295.
- 5- Hart RW, Dixit R . Adaptive role of caloric intake on the degenerative disease. Toxicology Sci 1999 ; 52:3-12
- 6-Cadenas E. Biochemistry of oxygen toxicity. Ann Rev Biochem1989;58:39-110
- 7- Skrhga J , kuhesove M. short-term very low calory diet reduces oxidative stress in obese type 2 diabetic patient .Physiol 2000 ; 5u :33-39